



HEI SINÄ 6.-LUOKKALAINEN TYTTÖ

Sinulle tarjotaan rokotetta kohdunkaulan syöpää aiheuttavaa papilloomavirusta (HPV) vastaan. Rokote on Suomen kansallisessa rokotusohjelmassa, ja sitä tarjotaan kaikille 6.-luokkalaisille tytöille.

HPV-infektio? Mitä siitä voi seurata?

HPV-infektio aiheuttaa papilloomavirus. Infektio on hyvin yleinen: kahdeksan ihmistä kymmenestä saa sen elämänsä aikana. Yleisin se on nuorilla.

HPV-infektio on tavallisesti oireeton ja ohimenevä. Noin yhdellä ihmisellä kymmenestä infektio kuitenkin pitkittyy, jolloin saattaa syntyä syöpää muistuttavia esiasteita. Osa esiasteista voi edetä syöväksi.

Suomessa kohdunkaulan syöpään sairastuu vuosittain noin 150 naista. Heistä noin 50 kuolee.

Rokote torjuu syöpää tehokkaasti

Papilloomavirus tarttuu ihon ja limakalvon kautta, yleensä yhdynnässä. HPV-rokote ehkäisee kohdunkaulan syöpää estämällä HPV-infektion. Rokote torjuu noin neljä kohdunkaulan syöpää viidestä. Rokote on kuitenkin otettava riittävän nuorena, jolloin ei ole vielä saanut virusta.

Rokotteen turvallisuudesta tiedetään paljon

HPV-rokote on tyttöjen rokotusohjelmassa muun muassa kaikissa Länsi-Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa. HPV-rokotteita on vuodesta 2007 annettu kymmeniä miljoonia annoksia ja mahdollisten haittavaikutusten ilmaantumista on seurattu tarkasti. Vakavat haitat ovat hyvin harvinaisia. Lähes kaikille tulee kuitenkin ohimeneviä paikallisia oireita, kuten pistospaikan kipua, punoitusta ja turvotusta.

Saat rokotteen koulussa

HPV-rokote on maksuton. Rokotesarjaan kuuluu kaksi pistosta, jotka annetaan olkavarteen. Ensimmäisen ja toisen pistoksen välillä pitää olla vähintään viisi kuukautta.

Kouluterveydenhoitaja ilmoittaa sinulle tarkemman rokotusajankohdan.

Juttele HPV-rokotteesta vanhempiesi kanssa. Keskustelkaa, tutustukaa aiheeseen. Lisätietoja saat kouluterveydenhoitajalta ja verkkosivuilta: www.tyttöjenjuttu.fi



TERVEYDEN JA
HYVINVOINNIN LAITOS